



UZH, Departement für Nutztiere
Winterthurerstrasse 260, CH-8057 Zürich

Prof. Dr. med. vet. Iris Margaret Reichler
Abteilungsleiterin Kleintierreproduktion

Frau
Katharina Fay Verwoerd

Dr. med. vet. Milena Gallana
Assistentzooärztin
Tel. +41 44 635 84 28
mgallana@vetclinics.uzh.ch

France

Zürich, 21/ März 2022

Rossanaz de la Perle des Bauges, geb. 23.10.2020, Chip: 250.

LOF 2 SEN.EN. 1757/135

Befund der Untersuchung auf ektopische Ureteren

Sehr geehrte Frau Verwoerd,

vielen Dank, dass Sie mit Rossanaz de la Perle des Bauges an der Studie zum Ausschluss von ektopischen Ureteren teilgenommen haben.

Im Ultraschall vom 01.03.2022 in Zürich konnten die Harnleitermündungen eindeutig dargestellt werden. Beide Harnleiter münden in den Harnblasenhals. **Ihr Hund wird als (B) eingestuft.**

Liegen eine oder beide Mündungen weiter hinten als normal, wird dies als Ektopie bezeichnet.

Wir unterscheiden normale Mündungen im Trigonum (A), ektopische Mündungen im Harnblasenhals (B) oder in der Harnröhre (C).

(B = Hunde mit Mündungen im Harnblasenhals ohne klinische Symptome; C = Hunde mit Mündungen in der Harnröhre oder mit Mündungen im Harnblasenhals und klinischen Symptomen). Bei Tieren, bei welchen die Harnleiter in der Harnröhre münden, sind klinische Symptome wahrscheinlicher.

Die Ektopie der Harnleiter führt zu einem erhöhten Risiko für aufsteigende Harnwegsinfektionen. Daher sollten Antibiotika stets nur nach Resistenzbestimmung eingesetzt werden.

Ebenso besteht ein erhöhtes Risiko für Inkontinenz/Harnträufeln nach Kastration, deshalb sollte die Kastration nur bei medizinischer Indikation (z.B. Gebärmuttervereiterung oder Hodentumoren) durchgeführt werden.

Für Auskünfte bezüglich künftiger Zuchteinsätze wenden Sie sich bitte an den Zuchtverband.

Bei Fragen dürfen Sie mich gerne kontaktieren.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. med. vet. Milena Gallana